

蛇莓配方颗粒

Shemei Peifangkeli

【来源】本品为蔷薇科植物蛇莓 *Duchesnea indica* (Andr.) Focke 带花、果的干燥全草经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】取蛇莓饮片 4000g,加水煎煮,滤过,滤液浓缩成清膏(干浸膏出膏率为 12.5%~25.0%),加入辅料适量,干燥(或干燥、粉碎),再加入辅料适量,混匀,制粒,制成 1000g,即得。

【性状】本品为棕褐色至深棕色的颗粒;气微,味微苦。

【鉴别】取本品 3g,研细,加甲醇 25ml,超声处理 30 分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇 2ml 使溶解,作为供试品溶液。另取蛇莓对照药材 1g,加水 50ml,煎煮 30 分钟,滤过,滤液蒸干,残渣自“加甲醇 25ml”起,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(中国药典 2020 年版通则 0502)试验,吸取上述两种溶液各 4 μ l,分别点于同一硅胶 G 薄层板上,以甲苯-乙酸乙酯-甲酸(5:4:1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】照高效液相色谱法(中国药典 2020 年版通则 0512)测定。


色谱条件与系统适用性试验 同〔含量测定〕项。

参照物溶液的制备 取蛇莓对照药材 1g,加水 50ml,加热回流 30 分钟,放冷,滤过,滤液浓缩至近干,残渣加 30% 甲醇 50ml 使溶解,摇匀,滤过,取续滤液,作为对照药材参照物溶液。另取〔含量测定〕项下的对照品溶液,作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 同〔含量测定〕项。

测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各 5 μ l,注入液相色谱仪,测定,即得。

供试品色谱中应呈现 6 个特征峰,并应与对照药材参照物色谱中的 6 个特征峰保留时间相对应,其中峰 1 应与没食子酸对照品参照物峰保留时间相对应。与没食子酸参照物峰相对应的峰为 S 峰,计算各特征峰与 S 峰的相对保留时间,其相对保留时间应在规定值的 $\pm 10\%$ 范围之内,规定值为: 1.97(峰 2)、3.09(峰 3)、3.33(峰 4)、3.90(峰 5)、4.86(峰 6)。



对照特征图谱

峰 1 (S)：没食子酸 峰 6：鞣花酸

【检查】应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典 2020 年版通则 0104）。

【浸出物】取本品适量，研细，取约 3g，精密称定，精密加入乙醇 100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 20.0%。

【含量测定】照高效液相色谱法（中国药典 2020 年版通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇为流动相 A，以 0.05%磷酸溶液为流动相 B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为 272nm。理论板数按没食子酸峰计算应不低于 5000。

时间（分钟）	流动相 A（%）	流动相 B（%）
0~5	10	90
5~14	10→29	90→71
14~20	29→34	71→66
20~25	34→43	66→57
25~30	43→49	57→51
30~35	49	51

对照品溶液的制备 取没食子酸对照品适量，精密称定，加30%甲醇制成每1ml含16μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约0.25g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加30%甲醇50ml，密塞，称定重量，超声处理（功率1130W，频率37kHz）10分钟，放冷，再称定重量，用30%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每 1g 含没食子酸（C₇H₆O₅）应为 1.6mg～7.5mg。

【规格】 每 1g 配方颗粒相当于饮片 4g。

【贮藏】 密封。